

SCHULE  
KINDERGARTEN



## Kopfläuse im Kindergarten oder in der Schule... WAS TUN?

Liebe Eltern,


in der Klasse bzw. Gruppe Ihres Kindes sind Kopfläuse festgestellt worden. Dies kann sich zu einer wahren Plage in der ganzen Schulklasse oder Kindergartengruppe ausweiten. Wir bitten Sie daher dringend um Ihre Mithilfe. Nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir lästigen Läuseepidemien vorbeugen.

**Läuse kann jeder bekommen – unabhängig von der persönlichen Sauberkeit.**

Bitte untersuchen Sie heute noch die Haare Ihres Kindes auf das Vorhandensein von Kopfläusen. Am Besten scheiteln Sie das angefeuchtete Haar mit einem feinen Kamm und suchen es bei guter Beleuchtung in der Nähe der Kopfhaut gründlich ab. Nehmen Sie sich dafür mindestens 15 Minuten Zeit. Wenn Sie lebende Läuse finden, sollten Sie unverzüglich eine Behandlung mit einem wirksamen Mittel gegen Kopfläuse aus der Apotheke durchführen (z. B. Dimet 20 oder InfectoPedicul Lösung).

### Bei einem Kopflausbefall können Sie auf dem Kopf folgende Stadien finden:

1. Erwachsene Kopfläuse – graue oder hellbraune Insekten mit abgeflachtem Körper und 6 Beinen
2. Lauseier – dunkle Verdickungen am Haar, ähnlich kleiner Knospen
3. Larven – junge Läuse
4. Leere Eihüllen (= Nissen) – nach dem Schlupf der Larve bleiben sie am Haar zurück, sie erscheinen im Licht weißlich.



Bei Läusebefall sind Sie dazu verpflichtet, diesen der Leitung des Kindergartens oder der Schule mitzuteilen. Bitte füllen Sie den unten stehenden Abschnitt aus und geben Sie ihn Ihrem Kind unterschrieben mit in die Schule oder den Kindergarten. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Die Patientenbroschüre „Lausige Zeiten“ enthält alle für Sie wichtigen Informationen rund um die Behandlung des Kopflausbefalls. Lesen Sie die Broschüre genau durch, damit Sie einen zuverlässigen Behandlungserfolg erzielen.

Weitere nützliche Tipps und Infos zum Thema Kopflausbefall finden Sie im Internet unter [www.kopflaus.info](http://www.kopflaus.info).

INFECTOPEDICUL (Wirkstoff Permethrin), Lösung und Dimet 20 (Dimeticon und Dodecanol). Zur Behandlung der Haare bei Befall mit Kopfläusen.  
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Bitte hier abtrennen und im Kindergarten oder in der Schule abgeben. Ihre Angaben werden selbstverständlich diskret behandelt.

### Erklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten des Kindes \_\_\_\_\_

- Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und keine Kopfläuse, Larven oder Eier gefunden.
- Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und habe Läuse, Larven oder Eier gefunden. Ich habe mein Kind mit einem Kopflausmittel gemäß der Packungsbeilage behandelt und die Haare mit einem Nissenkamm nass ausgekämmt. Ich versichere, dass ich nach 8 bis 10 Tage die erforderliche zweite Behandlung durchführen werde, um den Kopflausbefall sicher zu beseitigen.

Datum

Unterschrift eines Elternteils/Erziehungsberechtigten